

6 高次脳機能障害の代表的な症状

注意障害

- ・集中力が持続しない。
- ・少しの音や出来事に気をそらされてしまう。
- ・周囲の状況を見ずに興味のあるものへとびつきやすい。

記憶障害

- ・新しいことを覚えられない。
- ・同じことを何度も質問する。
- ・約束を守れない。
- ・大切なものをどこにしまったかわからなくなる。

遂行機能障害

- ・目標を達成するための段取りを立てられない。
- ・仕事を途中で投げ出してしまう。
- ・いつもと違う指示をすると混乱してしまう。

社会的行動障害

- ・感情のコントロールができず興奮しやすい。
- ・思い通りにならないと大声をだす。
- ・自分が中心でないと満足しない。

病識欠如

- ・自分自身の障害の存在を否定する。
- ・必要な治療やリハビリを拒否する。
- ・家族や支援者が障害のことを言っても理解しない。

半側空間無視

(多くは左半側に生じる)

- ・片側（多くは左側）に注意を向けられない。
- ・歩いていて片側をよくぶつける。
- ・片側のお皿を食べ残す。

失語

- ・話すことができない，滑らかに話せない。
- ・人が何を言っているのか理解できない。
- ・文字を書けない。
- ・文字を読めない。

失行

- ・今まで使っていた物の使い方がわからなくなった。
- ・ジェスチャーができない。
- ・指示された動作がうまくできない。
- ・服がうまく着られない。

失認

- ・見ただけではそれが何かわからない。
- ・触ったり聞いたりしただけではそれが何かわからない。
- ・知っているはずの人の顔を見ても誰かわからない。

見当識障害（地誌的障害）

- ・曜日・日付がわからない。
- ・よく分かっているはずの場所（近所）で道に迷う。
- ・自分が置かれている場所・周囲の人間関係がわからない。
- ・自宅のトイレがわからない。