

# 水稻生育情報 (No.3)

平成29年6月21日  
県西農林事務所 経営・普及部門  
(筑西地域農業改良普及センター)  
TEL:0296-24-9206

## 【生育概況】

6月中旬は天気の良い日が多く、気温はほぼ平年並みで、降水量が少なく、日照時間は多くなりました。今後1カ月も降水量は平年並みか少ない予報ですので、水管理に注意してください。

管内のコシヒカリの生育状況は表1の通りです。特に茎数が多くなっており、草丈はやや低く、葉色は調査地点により差が出ています。

表1 水稻定点調査結果 (6月20日時点)

調査地点	田植え日 月/日	植付株数 株/坪	草丈 cm	茎数 本/m <sup>2</sup>	葉色	
					葉色板	SPAD値
筑西市	5月2日	59	57.1	827	4.5	38.5
一本松	(5月2日)	(62)	(61.6)	(650)	(4.1)	(37.2)
下妻市	5月3日	47	50.8	681	4.3	39.1
加養	(5月1日)	(47)	(60.3)	(530)	(4.7)	(39.1)
桜川市	5月16日	62	40.9	493	4.4	41.4
元岩瀬	(5月11日)	(58)	(46.5)	(436)	(4.6)	(37.9)
桜川市	5月5日	56	51.1	504	4.1	37.7
真壁町飯塚	(5月6日)	(53)	(56.4)	(481)	(4.6)	(38.4)

( )内は平成24~28年(5ヵ年平均値) ※桜川市真壁町飯塚は過去4ヵ年の平均値

## 【これからの栽培管理のポイント】

### 1. イネ縞葉枯病の防除について

茨城県病害虫防除所から6月12日付で注意報が発表されており、県西地域で本病の発生が多くなることが予想されます。ウンカ類に登録のある育苗箱施薬を行わなかった場合は、本田防除を行いましょう。特に、昨年被害が大きかった地域では、育苗箱施薬と本田防除を併せて行うことが望ましいです。

なお、本田での防除適期は6月下旬までです。

防除方法や薬剤等に関してご不明な点がございましたら、お近くのJA各支店か普及センターにお問い合わせください。



ヒメトビウンカ成虫  
(茨城県農業研究所提供)

### 2. 中干しの終了の目安について

現在の生育では、ほとんどの圃場で中干しができる状態です。中干しを行っていない圃場では早急に中干しを開始して下さい。

なお、終了の目安は葉色が4(若竹色)以下に落ちたとき(落水してから概ね10日程度)です。終了時の田面の様子は、ひびが軽く入る程度又は足跡に水が少し残る程度です。写真を参考に中干しを終了し、中干し終了後は間断かん水を行って下さい。



中干し終了時期の目安