

大豆の生育状況（7月29日現在、水戸市）

| 地域名 | 品種     | 生育ステージ   | 対平年遅速 | 生育（作柄・品質）概況等                                                                                                                                                     | これまでに講じた対策<br>及び今後の方針                    |
|-----|--------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 水 戸 | 里のほほえみ | 第11本葉展開期 | 平年並み  | 1) 気象概況（6月17日～7月29日）<br>生育期間の平均気温は24.1℃で平年よりかなり低かった（平年差-1.6℃）。日照時間は209.6時間で平年よりかなり短かった（平年比76%）。降水量は194.5mmで平年並みだった（平年比87%）。<br>（水戸地方気象台観測値。平年値は直近5ヶ年の平均値。別紙に図示。） | ・紫斑病・莢害虫の防除を実施した。<br>（7月8日、21日）          |
|     | 納豆小粒   | 第12本葉展開期 | 平年並み  | 2) 生育概況<br>「里のほほえみ」は平年に比べて、主茎長、主茎節数は平年並み、分枝数は少なく、茎の太さはかなり太く、地上部生体重は平年並みだった。<br><br>「納豆小粒」は平年に比べて、主茎長は平年並み、主茎節数は多く、分枝数は少なく、茎の太さ、地上部生体重は平年並みだった。                   | ・カメムシ類、シロイチモジマダラメイガ等の莢害虫やハスモンヨトウを適宜防除する。 |

表 畑における生育(水戸市 茨城県農総セ農研 作物研究室)

| 品種名    | 播種日        |             |             | 主茎長        |            |            | 主茎節数      |            |            | 分枝数         |            |            | 茎の太さ       |            |            | 地上部生体重      |            |            |
|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|        | 本年<br>(月日) | 前年値<br>(月日) | 平年値<br>(月日) | 本年<br>(cm) | 前年比<br>(%) | 平年比<br>(%) | 本年<br>(節) | 前年比<br>(%) | 平年比<br>(%) | 本年<br>(本/株) | 前年比<br>(%) | 平年比<br>(%) | 本年<br>(mm) | 前年比<br>(%) | 平年比<br>(%) | 本年<br>(g/株) | 前年比<br>(%) | 平年比<br>(%) |
| 里のほほえみ | 6/17       | 6/19        | 6/20        | 36.9       | 81         | 95         | 11.4      | 95         | 103        | 1.6         | 54         | 79         | 9.5        | 97         | 119        | 60.4        | 66         | 91         |
| 納豆小粒   |            |             |             | 37.3       | 77         | 101        | 12.0      | 101        | 109        | 2.5         | 81         | 83         | 7.2        | 88         | 102        | 48.1        | 56         | 93         |


- 耕種概要
- |                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) 圃場（来歴）：表層腐植質黒ボク土                                                      | 2) 播種日：6月17日        |
| 3) 施肥量：N-P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -K <sub>2</sub> O＝0.3-1.0-1.0kg/a | 4) 平年値：令和3年～令和7年の平均 |
| 5) 茎の太さ：第1節(子葉節)と第2節(初生葉節)の節間で測定。                                        | 6) 中耕培土：7月22日       |



里のほほえみ（7月29日撮影）



納豆小粒（7月29日撮影）



令和8年半旬別気象経過図

（水戸地方気象台データを参考に作成。平年値は直近5年間の平均値。）