

農 研 速 報

令和8年8月3日発行

茨城県農業総合センター農業研究所
〒311-4203 茨城県水戸市上国井町3402
TEL029-239-7212 FAX 029-239-7306

生育状況（7月28日現在、水戸市）

県名 (試験場所)	品種	生育の状況	問題点	これまでに講じた対策及び今後の方針	備考
茨城県 (水戸市)	ベニアズマ べにはるか	気象概況：5月19日～7月28日(直近5ヵ年の平年値との比較(水戸地方気象台観測値))。 上記期間の平均気温は22.4℃で、平年(23.3℃)に比べてかなり低かった。 降水量は497mmで、平年(409mm)に比べてやや多かった。 日照時間は368時間で、平年(422時間)に比べてかなり少なかった。 生育概況：令和2年度より株間を25cmから35cmに変更した。なお、両品種ともに、令和3年度から令和7年度の5か年の平均値を平年値として記載した。 地上部の生育(茎葉重)： 平年値に対して「ベニアズマ」はやや重く、「べにはるか」は平年並みだった。 地下部の生育(総いも重)： 平年値に対して「ベニアズマ」はかなり軽く、「べにはるか」は平年並みだった。 1株当たりの塊根数は両品種ともやや多く、塊根1個重は「ベニアズマ」がかなり軽く、「べにはるか」がやや軽かった。 挿苗後は降雨があり、活着が良く初期生育は順調だったが、上いも重は「ベニアズマ」がかなり軽く、「べにはるか」がやや軽く、塊根の肥大は遅れている様子だった。	特になし	7月15日にナカジロシタバの防除を行った。 引き続き、病害虫、特にナカジロシタバの発生に注意し、適宜防除を行う。	

表 生育調査(挿苗後70日、7月28日調査)

品種	茎葉重			1株当たり塊根数			塊根1個重			総いも重			上いも重		
	本年 (kg/a)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (個)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (g)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (kg/a)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (kg/a)	前年比 (%)	平年比 (%)
ベニアズマ	291.6	101 (287.5)	121 (241.0)	7.2	75 (9.6)	116 (6.2)	39.7	86 (46.1)	67 (59.3)	81.0	64 (125.9)	81 (99.9)	59.0	61 (96.5)	71 (83.2)
べにはるか	306.3	174 (176.2)	116 (262.9)	7.1	79 (9.0)	110 (6.4)	44.6	109 (40.9)	85 (52.2)	90.5	87 (104.5)	97 (93.5)	67.2	86 (78.2)	87 (77.6)

() 内は前年または平年の数値。平年値は令和3～令和7年(5ヵ年)のデータの平均値。

塊根は直径3mm以上のもの、上いも重は一個50g以上のものとした。


挿苗日：5月19日、黒マルチ栽培、栽植密度：286株/a(畦間100cm×株間35cm)、施肥量(kg/a)：N-P₂O₅-K₂O=0.3-1.0-1.0

農研所内圃場における生育状況（7月28日撮影）



ベニアズマ

べにはるか



半旬別の平均気温、降水量、日照時間（水戸地方气象台データをもとに作成）