

防除所レポート [ナシヒメシンクイの防除適期の予測]

- ① ナシヒメシンクイ第二世代幼虫を対象とした防除適期は、第一世代成虫の誘殺数がピークに達した日の7～9日後である。
- ② 各地点の第一世代成虫の誘殺最盛期は、越冬世代成虫のフェロモントラップへの誘殺最盛期と有効積算温度から予測し、おおむね平年並～やや早い。
- ③ 表中のかすみがうら市、土浦市、筑西市(旧下館市)については、今後、病害虫防除所ホームページで誘殺状況を随時更新するので参考にする。

表 調査圃場におけるナシヒメシンクイ第二世代幼虫の予測防除適期

地点	第二世代幼虫の予測防除適期 ¹⁾		
笠間市	6月19日	～	6月23日
小美玉市	6月18日	～	6月23日
石岡市	6月13日	～	6月17日
かすみがうら市	6月13日	～	6月17日
土浦市	6月13日	～	6月17日
筑西市(旧下館市)	6月13日	～	6月16日
筑西市(旧関城町)	6月12日	～	6月15日

1) 第一世代成虫の誘殺最盛期を基に予測した(5月26日現在)。

茨城県病害虫防除所
病害虫発生予報6月号(令和5年)より抜粋