


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年1月19日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 36°30'
 E 140°57'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	39.5	861.2	26
2	m	33.6	466.7	19
3	m	31.0	319.7	13
4	m	30.3	282.5	7
5	m	30.4	318.3	18
6	m	30.6	312.1	9
7	m	29.1	284.8	13
8	m	27.2	243.1	17
9	m	29.7	310.4	19
10	m	29.2	279.9	14
11	m	30.6	271.2	10
12	m	28.3	263.7	16
13	m	29.2	267.8	11
14	m	29.7	291.5	11
15	m	29.9	301.8	19
16	m	29.0	256.2	8
17	m	28.9	277.0	13
18	m	28.7	263.8	16
19	m	30.6	324.4	17
20	m	29.5	256.3	9
21	m	31.1	345.9	17
22	m	32.6	408.2	18
23	m	30.7	340.0	17
24	m	30.6	315.8	16
25	m	29.0	272.4	15
26	m	28.6	269.1	17
27	m	28.2	256.3	13
28	m	28.4	221.9	12
29	m	30.6	331.1	14
30	m	29.6	282.7	18

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

