


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年2月9日  
 水揚港 : 銚子  
 漁場 : N 36°35'  
 E 141°01'

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	29.9	298.7	13
2	m	29.9	272.6	8
3	m	30.5	292.6	12
4	m	29.5	268.8	9
5	m	29.5	263.6	11
6	m	30.9	335.1	11
7	m	28.9	247.7	9
8	m	30.3	307.9	14
9	m	30.6	283.2	8
10	m	30.6	277.4	8
11	m	29.3	272.7	17
12	m	28.1	248.7	16
13	m	28.5	239.2	12
14	m	29.2	281.7	13
15	m	30.8	290.8	8
16	m	29.9	292.8	12
17	m	26.7	193.0	9
18	m	25.5	143.2	5
19	m	28.3	239.7	14
20	m	28.5	248.6	14
21	m	27.8	246.0	14
22	m	27.4	205.7	11
23	m	28.7	248.5	9
24	m	26.8	182.1	7
25	m	28.0	203.5	5
26	m	29.2	252.3	9
27	m	27.9	212.5	10
28	m	28.3	221.7	8
29	m	24.1	135.9	8
30	m	25.6	175.0	7

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

