


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年2月14日
 水揚港 : 波崎
 漁場 : N 35°56'
 E 141°00'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	40.5	791.7	5
2	m	36.2	684.3	21
3	m	27.9	229.2	9
4	m	30.5	307.7	8
5	m	28.3	223.4	7
6	m	29.9	273.5	9
7	m	29.0	263.7	16
8	m	25.1	140.6	4
9	m	27.2	198.5	7
10	m	26.2	180.4	9
11	m	23.7	128.7	9
12	m	28.5	226.1	11
13	m	28.4	218.8	6
14	m	28.7	251.5	7
15	m	27.8	225.1	10
16	m	28.3	216.6	6
17	m	28.7	244.8	10
18	m	27.6	220.3	9
19	m	27.9	202.0	6
20	m	23.8	133.0	8
21	m	29.8	249.0	4
22	m	28.8	245.1	6
23	m	28.4	222.7	11
24	m	28.2	224.2	12
25	m	27.2	216.2	16
26	m	28.3	238.3	14
27	m	28.6	236.1	8
28	m	28.5	259.9	16
29	m	28.0	229.8	9
30	m	28.0	206.7	7

測定機器：近赤外分光器（FQA-NIRGUN） 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

