


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年11月8日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 40°10'
 E 142°08'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	30.4	408.8	29
2	m	31.7	418.6	27
3	m	30.1	357.1	27
4	m	30.9	356.0	20
5	m	31.0	353.3	17
6	m	26.6	196.2	5
7	m	28.6	263.1	8
8	m	30.1	330.2	15
9	m	31.1	386.4	27
10	m	29.8	305.4	14
11	m	30.7	318.3	17
12	m	30.4	349.9	29
13	m	30.2	324.3	18
14	m	32.8	394.6	14
15	m	31.2	458.6	34
16	m	30.2	333.0	21
17	m	29.7	328.6	16
18	m	32.0	439.7	22
19	m	31.5	381.3	16
20	m	29.9	327.2	14
21	m	25.9	180.0	11
22	m	31.4	349.7	26
23	m	30.7	339.7	11
24	m	28.3	239.1	18
25	m	28.8	285.1	27
26	m	29.0	282.2	14
27	m	26.7	206.8	11
28	m	28.0	230.5	11
29	m	30.4	299.7	9
30	m	31.0	385.6	36

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

