


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2019年4月4日  
 水揚港 : 銚子  
 漁場 : 中部海区

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	32.8	437.7	9
2	m	32.5	427.4	7
3	m	33.9	482.4	5
4	m	34.7	436.1	3
5	m	33.0	426.3	6
6	m	33.9	407.6	4
7	m	33.0	399.2	5
8	m	31.9	351.4	5
9	m	33.8	436.7	5
10	m	33.6	441.0	4
11	m	33.5	471.4	10
12	m	32.0	381.2	5
13	m	34.0	421.4	7
14	m	29.8	299.8	5
15	m	32.4	411.1	9
16	m	32.7	417.3	5
17	m	33.7	712.9	13
18	m	32.6	362.6	3
19	m	32.5	445.0	6
20	m	32.3	355.3	5
21	m	31.6	357.4	6
22	m	36.7	555.6	3
23	m	31.8	403.3	4
24	m	31.6	380.2	4
25	m	33.6	469.9	5
26	m	31.9	403.4	6
27	m	32.3	402.6	5
28	m	33.8	501.6	6
29	m	31.9	406.0	5
30	m	31.2	370.0	4

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

