

福島第一原子力発電所事故に係る
特別調査結果の概要
(令和2年4月から令和3年1月まで)

令和3年3月

茨城県防災・危機管理部
原子力安全対策課

I 特別調査結果の概要

1	空間線量率	
1-1	県内全44市町村の1m高さの常時測定における空間線量率測定	1
1-2	航空機モニタリング測定	1
1-3	KURAMA II 走行サーベイ測定	1
2	海水	
2-1	沿岸測定	1
2-2	沖合測定	2
2-3	外洋測定	2
2-4	海水浴場測定	2
3	海底土	
3-1	海底土測定	3
4	公共用水域等	
4-1	公共用水域等の水質・底質測定	3
4-2	霞ヶ浦流入河川及び湖内の水質・底質測定結果	3
5	地下水	
5-1	地下水測定	3
6	飲料水	
6-1	飲料水測定	4
7	農産物	
7-1	野菜類測定	4
7-2	果樹類測定	4
7-3	茶測定	4
7-4	穀類・豆類測定	5
7-5	特用林産物測定	5
8	畜産物	
8-1	原乳測定	5
8-2	牛肉（全頭検査）測定	6
8-3	豚肉、鶏肉、鶏卵測定	6
8-4	その他	6
9	水産物	
9-1	水産物測定	6
10	加工食品等	
10-1	加工食品等測定	7
11	流域下水道等	
11-1	脱水汚泥・焼却灰測定	7

Ⅱ 参考資料

表Ⅱ－1	農畜産物測定検体数一覧（令和3年1月27日現在）	8
表Ⅱ－2	茨城県における出荷制限指示等の状況 （令和2年12月25日現在）	9
図Ⅱ－1	令和3年2月1日12時における 全市町村放射線量率測定結果（地上1m）	10
図Ⅱ－2	茨城県沖合の海域モニタリング地点	11
図Ⅱ－3	茨城県外洋の海域モニタリング地点	12
表Ⅱ－3	規制値一覧	13
表Ⅱ－4	国、県等のホームページ上の公表データのURL	14

I 特別調査結果の概要

県内全域で実施している、東京電力（株）福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質放出の影響に係る調査について、令和3年2月1日現在、最新の結果の概要は以下のとおりである。

1 空間線量率

1-1 県内全44市町村の1m高さの常時測定における空間線量率測定

○測定者：原子力規制庁、県

○測定方法

- ・測定場所：市町村役場等（県内全44市町村）
- ・測定高さ：1m
- ・測定期間：平成24年4月1日（日）から常時測定
- ・測定器

固定型モニタリングポスト : 9基

可搬型モニタリングポスト : 30基

既存のモニタリングポストを1m高さに変更 : 5基

○測定結果

- ・県内全44市町村の平均値は、令和2年4月1日12時（ $0.050 \mu\text{Sv}/\text{時}$ ）から令和3年2月1日12時（ $0.047 \mu\text{Sv}/\text{時}$ ）においてわずかに減少した。

（単位： $\mu\text{Sv}/\text{時}$ ）

測定月	令和2年4月1日12時	令和3年2月1日12時
44市町村平均値	0.050^{*1}	0.047^{*2}

※1 2測定局（神栖市、五霞町）が長期欠測のため、42市町村平均値。また、1測定局（境町）は当日欠測のため、4月2日12時の値を採用

※2 3測定局（守谷市、土浦市、古河市）は当日欠測のため、別日（守谷市：1月26日、土浦市：12月10日、古河市：12月14日）の12時の値を採用

1-2 航空機モニタリング測定

○実施者：原子力規制庁

○測定方法

- ・測定場所：福島第一原子力発電所から80km圏内及び圏外（茨城県：全域）
- ・測定期間：令和2年8月25日～10月30日
- ・測定手法：民間のヘリコプターに航空機モニタリングシステムを搭載し、地上300m程度から測定

○測定結果

- ・空間線量率は、県内面積割合で約97%が $0.1 \mu\text{Sv}/\text{h}$ 以下となっている。

1-3 KURAMA II 走行サーベイ測定結果

○実施者：原子力規制庁、市町村等

○測定方法

- ・測定場所：県内における道路
- ・測定期間：令和2年10～11月実施
- ・測定手法：車内に放射線測定器（KURAMA II）を搭載し、地上に蓄積した放射性物質からのガンマ線を詳細かつ迅速に測定する手法。
- ・測定高さ：地上1m

2 海水

2-1 沿岸測定

○実施者：東京電力ホールディングス株式会社

○測定方法

- ・採水場所：茨城県沖合 3km：6 地点（詳細は、図Ⅱ-2 を参照。）
- ・採水頻度：1 ヶ月に 1 回程度（セシウム 134、137）
- ・測定器
放射性セシウム：ゲルマニウム半導体検出器
- ・採水深さ：上層（表層～2m）、下層（海底より 2～3m 上）

○測定結果

- ・セシウム 134、137 について、月 1 回実施し、全地点で不検出であった。

2-2 沖合測定

○測定者：原子力規制庁

○測定方法

- ・採水場所：茨城県沖合 30～90km：10 地点（実際の採水場所は 10～40km）
（詳細は、図Ⅱ-2 を参照。）
- ・採水頻度：3 ヶ月に 1 回程度
- ・測定器
放射性セシウム：ゲルマニウム半導体検出器
放射性ストロンチウム：ガスフロー計数装置

○測定結果

（令和 2 年 5 月）

- ・セシウム 134 は、表層で不検出、下層で不検出～0.000073Bq/L であった。
- ・セシウム 137 は、表層で 0.0015～0.0021Bq/L、下層で 0.00062～0.0025Bq/L であった。
- ・ストロンチウム 90（2 地点で表層のみ実施）は、0.00078 Bq/L と 0.00081Bq/L であった。

（令和 2 年 8 月）

- ・セシウム 134 は、表層で不検出、下層で不検出～0.000077Bq/L であった。
- ・セシウム 137 は、表層で 0.0014～0.0017Bq/L、下層で 0.00057～0.0023Bq/L であった。

（令和 2 年 11 月）

- ・セシウム 134 は、表層で不検出～0.000082Bq/L、下層で不検出であった。
- ・セシウム 137 は、表層で 0.0014～0.0022Bq/L、下層で 0.00057～0.0019Bq/L であった。

2-3 外洋測定

○測定者：原子力規制庁

○測定方法

- ・採水場所：茨城県外洋 90km～：3 地点（詳細は、図Ⅱ-3 を参照。）
- ・採水頻度：6 ヶ月に 1 回程度
- ・測定器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・採水深さ：表層、下層（水深 100、200、300、500m）

○測定結果

（令和 2 年 7 月）

- ・セシウム 134 は、表層、下層ともに不検出であった。
- ・セシウム 137 は、表層で 0.0013～0.0019Bq/L、下層で 0.00093～0.0024Bq/L であった。

2-4 海水浴場測定

○実施者：県

○測定方法

- ・採水場所：18 海水浴場
- ・採水時期：令和 2 年 4 月 6 日～令和 2 年 5 月 25 日（3 回）

※ 例年5回実施しているが、新型コロナウイルス拡大防止の観点から、海水浴場の開設を中止したことを受けて、4、5回目の測定は中止となった。

・測定器

空間線量率：NaI シンチレーション式サーベイメータ

放射性ヨウ素、放射性セシウム：ゲルマニウム半導体検出器

トリチウム：液体シンチレーションカウンタ

・採水深さ：深さ 1.5m 地点の表層、下層

○測定結果

(海水測定結果)

・全地点で放射性ヨウ素、放射性セシウム及びトリチウムは不検出であった。

(空間線量率)

・17海水浴場の砂浜の放射線量率(砂浜表面、50cm、1m)を測定した結果は、 $0.03\sim 0.06\ \mu\text{Sv}/\text{時}$ であった。

※姥の懐マリンプールは砂浜がないため、測定対象外

3 海底土

3-1 海底土測定

○測定者：原子力規制庁

○測定方法

・採泥場所：茨城県沖合 30～90km：10 地点(詳細は、図Ⅱ-2を参照。)

・採泥頻度：3ヶ月に1回程度

・測定器

放射性セシウム：ゲルマニウム半導体検出器

放射性ストロンチウム：ガスフロー計数装置

○測定結果

(令和2年5月)

・セシウム 134 は、不検出～5.5Bq/kg・乾土であった。

・セシウム 137 は、0.30～97Bq/kg・乾土であった。

(令和2年8月)

・セシウム 134 は、不検出～4.8Bq/kg・乾土であった。

・セシウム 137 は、0.73～91Bq/kg・乾土であった。

・ストロンチウム 90 は、不検出～0.30 Bq/kg・乾土であった。

4 公共用水域等

4-1 公共用水域等の水質・底質測定

○実施者：環境省

○測定方法

・測定期間：年4回

1回目：中止*

2回目：令和2年8月3日～8月28日

3回目：令和2年11月4日～11月29日

※ 令和2年度は新型コロナウイルス拡大防止の観点から、第1回目の調査を中止

・測定場所：那珂川水系、利根川水系、霞ヶ浦、北浦、ダムなど77地点

・測定器：ゲルマニウム半導体検出器

○測定結果

・水質：放射性セシウムは、全地点において不検出であった。

・底質：

2回目：放射性セシウムは、不検出～704Bq/kg 乾であった。

3回目：放射性セシウムは、不検出～1,002 Bq/kg 乾であった。

4-2 霞ヶ浦流入河川及び湖内の水質・底質測定

○実施者：環境省

○測定方法

・測定期間：年4回*

1回目：中止*

2回目：令和2年8月3日～8月7日

3回目：令和2年11月4日～11月18日

※ 令和2年度は新型コロナウイルス拡大防止の観点から、第1回目の調査を中止

・測定場所

霞ヶ浦流入河川：24河川

霞ヶ浦湖内：8地点

・測定器：ゲルマニウム半導体検出器

○測定結果

・水質：放射性セシウムは、全地点において不検出であった。

・底質：

2回目：放射性セシウムは、18～704Bq/kg 乾であった。

3回目：放射性セシウムは、16～947Bq/kg 乾であった。

5 地下水

5-1 地下水測定

○実施者：環境省

○測定方法

・採取期間：令和2年5月18日～6月19日

・採取地点：27地点

・測定器：ゲルマニウム半導体検出器

○測定結果

放射性セシウムは、全地点において不検出であった。

6 飲料水

6-1 飲料水測定

○実施者：県

○測定方法

・測定頻度：月に1回程度

・測定市町村：県内10地点の浄水場等

・測定器：ゲルマニウム半導体検出器

・測定容器：2Lマリネリ容器

・基準値：10Bq/kg

○測定結果

・令和2年4月～令和3年1月において、全て不検出であった。

7 農産物

7-1 野菜類測定

○実施者：県

○測定方法

- ・測定頻度：2週間に1回程度
- ・測定器：NaI スペクトロメータ
- ・測定容器：V-5 容器（内径 12.8cm）
- ・基準値：100Bq/kg

○測定結果

- ・令和2年4月～令和3年1月において、全て不検出であった。

7-2 果樹類測定

○測定者：県

○測定方法

- ・測定頻度：収穫時期に合わせて実施
- ・測定器：NaI スペクトロメータ
- ・測定容器：V-5 容器（内径 12.8cm）
- ・基準値：100Bq/kg

○測定結果

- ・令和2年4月～令和3年1月において、全て不検出であった。

7-3 茶測定

○測定者：県

○測定方法

- ・測定頻度：収穫時期に合わせて実施
- ・測定器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・測定容器：V-5 容器（内径 12.8cm）
- ・基準値：10Bq/kg（飲用茶）、200Bq/kg（荒茶）

○測定結果等

- ・令和2年4月～令和3年1月において、全て不検出であった。

7-4 穀類・豆類測定

○測定者：県

○測定方法

- ・測定頻度：収穫時期に合わせて実施
- ・測定器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・測定容器：V-5 容器（内径 12.8cm）
- ・基準値：100Bq/kg

○測定結果

- ・令和2年4月～令和3年1月において、小麦等など穀類・豆類の測定結果（放射性セシウムの合計）は、不検出～7.5Bq/kgであった。

7-5 特用林産物測定

○測定者：県

○測定方法

- ・測定頻度：平成23年10月から定期的に測定
- ・測定器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・測定容器：V-5 容器（内径 12.8cm）
- ・基準値：100Bq/kg（乾しシイタケ：乾燥前 100Bq/kg、水で戻した後 100Bq/kg）

○測定結果

- ・令和2年4月～令和3年1月において、タケノコ、原木シイタケなど特用林産物の測定結果

(放射性セシウム) は、不検出～1,106Bq/kg であった。

8 畜産物

8-1 原乳測定

○測定者：県

○測定方法

- ・測定頻度：2ヶ月に1回程度
- ・測定地点：2地点（クーラーステーション）
- ・測定器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・測定容器：2L マリネリ容器
- ・基準値：50Bq/kg

○測定結果

- ・令和2年4月～令和3年1月において、全て不検出であった。

8-2 牛肉（全頭検査）測定

○測定者：県

○測定方法

- ・測定検体（選定方法）：

県内と畜場で処理される牛全頭

- ・測定器：NaI スペクトロメータ（ゲルマニウム半導体検出器）

※平成23年8月29日（月）以降、NaIスペクトロメータを活用したスクリーニング検査も併用して全戸・全頭検査を実施しており、NaIスペクトロメータの検査にて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課が平成23年10月4日付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について」で示している、放射性セシウムのスクリーニングレベルである規制値の1/2（50Bq/Kg）以上の場合、ゲルマニウム半導体検出器にて測定。

- ・測定容器：500ml マリネリ容器
- ・基準値：100Bq/kg

○測定結果

※令和2年3月31日をもって牛肉の全頭検査は終了した。

8-3 その他

○測定者：県

○測定方法

- ・測定頻度

イノシシ肉：石岡市は全頭検査、その他の市町村は試料提供時

- ・測定器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・測定容器：U-8 容器（内径 56mm）、V-5 容器（内径 12.8cm）
- ・基準値：100Bq/kg

○測定結果

（石岡市）

- ・令和2年4月～令和3年1月において、測定結果（放射性セシウム）は、不検出～55 Bq/kg であり、全て基準値を下回った。

（その他の市町村）

- ・令和2年4月～令和2年10月において、測定結果（放射性セシウム）は、3.7～62 Bq/kg であり、全て基準値を下回った。

9 水産物

9-1 水産物測定

○実施者：県

○測定方法

- ・測定頻度：1週間に1回程度
- ・測定器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・測定容器：V-5 容器（内径 12.8cm）
- ・基準値：100Bq/kg

○測定結果

- ・令和2年4月～令和3年1月において、測定結果（放射性セシウムの合計）は、海産物で不検出～3.5Bq/kg、内水面で不検出～37.5Bq/kg であり、全て基準値を下回った

10 加工食品等

10-1 加工食品等測定

○測定者：県

○測定方法

- ・測定頻度
茶系飲料、菓子、そうざい等：月に8検体程度
- ・測定器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・測定容器：2L マリネリ容器、U-8 容器（内径 56mm）
- ・基準値：表Ⅱ-3「規制値一覧」（15 ページ）を参照

○測定結果

- ・令和2年4月～令和3年1月において、測定結果（放射性セシウムの合計）は、全て不検出であった。

11 流域下水道等

11-1 脱水汚泥・焼却灰測定

○実施者：県、市町村等

○測定方法

- ・測定頻度：1ヶ月に1回程度
- ・測定器：ゲルマニウム半導体検出器、NaI スペクトロメータ
- ・測定容器：V-5 容器（内径 12.8cm）

○測定結果

（県）

- ・令和2年4月～12月まで脱水汚泥の測定結果は、全て不検出であった。
- ・令和2年4月～12月まで焼却灰の測定結果は、放射性セシウムが不検出～190Bq/kg であった。

（市町村等）

- ・令和2年6、9、12月において脱水汚泥の測定を実施し、放射性セシウムは全て不検出であった。

II 參考資料

表Ⅱ-1 農畜産物測定検体数一覧 (令和3年1月27日現在)

	品目数	検体数	主な品目
穀類	10	4,336	米(玄米)、麦類、そば(玄そば)、落花生、大豆 等
野菜類	51	1,746	ホウレンソウ、パセリ、ネギ、ミズナ、トマト、イチゴ、カンショ 等
果樹類	12	268	ウメ、ナシ、ブルーベリー、ブドウ、リンゴ、クリ 等
特用林産物	70	2,954	原木しいたけ、野生きのこ類、タケノコ、こごみ 等
畜産物	6	245,620	原乳、牛肉(全頭検査分含む)、豚肉、鶏肉、鶏卵、馬肉
魚介類	187	18,449	シラス、カタクチイワシ、カレイ類、ヤマトシジミ、アユ 等
茶	3	358	生茶葉、荒茶、飲用茶
農産加工品	1	44	干しいも
水産加工品	20	33	シラス干し、ワカサギ煮干し、蒸しダコ 等
計	360	273,808	

表Ⅱ－２ 茨城県における出荷制限指示等の状況（令和２年12月25日現在）


茨城県における出荷制限指示等の状況		令和2年12月25日現在	
品目	制限・要請等の適用範囲	区分*	指示等の発出時期
(1) 特産林産物			
原木しいたけ (露地栽培、施設栽培) ※印：露地栽培のみ出荷制限または出荷制限を行っている産地 ▲印：出荷制限(施設栽培)の一部解除を行っている産地 ▼印：出荷制限(露地栽培)の一部解除を行っている産地 ■印：出荷自粛(施設栽培)の一部解除を行っている産地 ◆印：出荷自粛(露地栽培)の一部解除を行っている産地	小湊玉面★▼、新田面▲、行方市★▼、土浦市▲▼	国指示	H23.10月
	茨城町▲、阿見町★		H23.11月
	常陸大宮市★、ひたちなか市★、那珂市★、つくばみらい市★、守谷市★		H24.4月
	日立市■、高萩市、水戸市★、笠間市◆◆、城道町◆、石岡市◆◆、かすみがうら市◆◆、稲川市★	県要請	H24.3月
タケノコ	北茨城町	国指示	H24.4月
こしあぶら(野生)	日立市、常陸太田市、常陸大宮市	国指示	H24.5月
	城道町		H26.5月
	北茨城町、高萩市、太子町、笠間市、石岡市、稲川市		H1.5月
ぬしいたけ	日立市、常陸太田市、常陸大宮市、笠間市、城道町 <small>※1)平成30年産品は既に流通しているため、平成31年産品から出荷制限を実施する。 ※2)ぬしいたけは、出荷者が確認できる産地(施設)で行う産地を指定する。 ※3)茨城県において出荷制限指示等を実施している産地については、出荷制限指示等も適用されること(市町村)を要する。</small>	県要請	H24.4月
野生のきのこ類	城道町、北茨城町、高萩市	国指示	R1.12月
	日立市、常陸太田市、笠間市、太子町		H2.11月
	石岡市、つくば市		H2.12月
(2) 魚介類			
内水産			
アメリカナマズ	茨城県北茨城および外茨城産品並びにこれらの産地に流入する河川並びに常陸利根川において産獲されたもの(産獲を除く)	国指示	H24.4月
ウナギ	茨城県内の利根川のうち境大橋の下流(支流を含む)において産獲されたもの(ただし、霞ヶ浦、北茨城および外茨城産品並びにこれらの産地に流入する河川並びに常陸利根川を除く)		H25.11月
(3) 野鳥鳥獣の肉類			
イノシシ肉	県内全域。ただし、石岡市内のイノシシ肉加工施設が出荷するイノシシ肉を除く	国指示	H23.12月

* 国指示：国の原子力災害特別措置法に基づく出荷制限指示

県要請：県の出発・販売の自粛要請



図Ⅱ-2 茨城県沖合の海域モニタリング地点
(海域モニタリングの進め方 出典：原子力規制庁)



図Ⅱ-3 茨城県外洋の海域モニタリング地点
(海域モニタリングの進め方 出典：原子力規制庁)

表Ⅱ－3 規制値一覧

項 目		規 制 値 等	
		放射性セシウム (Bq/kg)	
飲 食 物	飲料水	10	
	牛乳・乳製品	50	
	乳児用食品	50	
	一般食品	100	
	魚介類 (※)	100	
	乾しシイタケ	乾燥前	100
		水で戻した後	100
	茶	飲用茶	10
荒茶		200	
牧草	乳牛用	100	
肥料、土壌改良材、培土		400	
飼料	牛、馬	100	
	豚	80	
	家きん	160	
	養殖魚	40	
調理加熱用の薪、木炭	薪	40	
	木炭	280	
土壌	水稻の作付制限	5,000 (平成23年度)	

(※) 海産魚介類については、茨城県・茨城沿海地区漁連の連名による3月15日付け「海産魚介類における放射性物質の新基準値への対応について」において、50Bq/kg 超 100Bq/kg 以下の魚種は自主的に生産を自粛することとなっている。

表Ⅱ－４ 国、県等のホームページ上の公表データのURL

項目	ホームページURL
放射線モニタリング情報 全国及び福島県の空間線量測定結果 (原子力規制委員会ホームページ)	http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/
航空機モニタリング (原子力規制委員会ホームページ)	http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/191/list-1.html
KURAMAⅡ走行サーベイ (原子力規制委員会ホームページ)	https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/362/list-1.html
放射線モニタリング情報 海域モニタリング (原子力規制委員会ホームページ)	http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/428/list-1.html
環境モニタリング調査 公共用水域 (環境省ホームページ)	http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.html
環境モニタリング調査 地下水質 (環境省ホームページ)	http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-gw.html
福島第一原子力発電所事故に伴う放射線の影響全般（大気・水道・土壌・農産物・畜産物・水産物、その他各施設の放射線濃度等） (茨城県ホームページ)	http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/important/20110311eq/index.html