

ミクリ

Sparganium erectum L.

ミクリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州・四国・九州／ユーラシア・北アフリカの温帯

生 育 地 浅い水中に生える。県北，県央，鹿行，県南地域に生育する。

選 定 理 由 河川の改修，溜池の埋立

そ の 他



水戸市 (内山)

ツクバスゲ

Carex blepharicarpa Franch. var. *stenocarpa* Ohwi

カヤツリグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州 (近畿以北)・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 林下の岩上などに生える。筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



筑波山 (内山)

アワボスゲ

Carex brownii Tuck.

カヤツリグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東アジア～豪州

生 育 地 丘陵地の半日陰に生える。県北地域や筑波山，稲敷市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



筑波山 (内山)

ジョウロウスゲ

Carex capricornis Meish. ex Maxim.

カヤツリグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 北海道・本州（関東以北）／アジア東部

生 育 地 水湿地に生える。東海村，行方市，つくば市，小美玉市，土浦市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



ひたちなか市（内山）

ヤマクボスゲ

Carex hymenodon Ohwi

カヤツリグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州（宮城県，栃木県）〔日本固有種〕

生 育 地 山地の水湿地に生える。県内の産地は少なく，常陸太田市に生育する。

選 定 理 由 森林伐採，生育地点が少ない

そ の 他 これまでは宮城県，栃木県に限られていたが，茨城県にも生育することが確認された（80）。



（県博収蔵標本：常陸太田市産）

ヤガミスゲ

Carex maackii Maxim.

カヤツリグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東北アジア

生 育 地 川岸や平地の湿気のある草原に生える。県南，県西地域に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



常総市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

カンエンガヤツリ

Cyperus exaltatus Retz. var. *iwasakii* (Makino) T.Koyama

カヤツリグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧
茨城県1997 危急種
環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州／東アジア
生 育 地 湿地にまれに生える。県内各地の湿地に生育する。生育地は安定しない。
選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行
そ の 他



取手市 (内山)

ビロードテンツキ

Fimbristylis sericea (Poir.) R.Br.

カヤツリグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧
茨城県1997
環境省2012

分 布 本州 (茨城・富山以西)・四国・九州・琉球
／アジア東部～南部・豪州
生 育 地 海岸の砂地に生える。県北，県央，鹿行地域に生育する。
選 定 理 由 海岸の開発
そ の 他



ひたちなか市 (内山)

イトイヌノハナヒゲ

Rhynchospora faberi C.B.Clarke

カヤツリグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧
茨城県1997 希少種
環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東アジア
生 育 地 平地または丘陵地の湿地に生える。水戸市，笠間市，筑西市に生育する。
選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行
そ の 他



笠間市 (内山)

ノグサ

Schoenus apogon Roem. et Schult.

カヤツリグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／インドネシア・豪州

生 育 地 平地の日当たりのよいやや湿った草地に生える。高萩市，日立市，常陸太田市，神栖市，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



東海村（内山）

ギンラン

Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国，九州／朝鮮

生 育 地 山地林下に生える。県内各地に生育するが，個体数は少ない。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（内山）

キンラン

Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 山や丘陵地の林下に生える。県内各地に生育するが，個体数は少ない。

選 定 理 由 園芸採取，森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（藤田）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ハマカキラン

Epipactis papillosa Franch. et Sav. var. *sayekiana* (Makino) T.Koyama et Asai

ラン科

| | |
|---------|-------------------------------|
| 茨城県2012 | 準絶滅危惧 |
| 茨城県1997 | 危急種 |
| 環境省2012 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
| 分 布 | 本州（青森県から愛知県に至る太平洋側の海岸） |
| 生 育 地 | 海岸のクロマツ林下に生える。主に県北各地の海岸に生育する。 |
| 選 定 理 由 | 海岸の開発 |
| そ の 他 | |



ひたちなか市（内山）

オニノヤガラ

Gastrodia elata Blume

ラン科

| | |
|---------|----------------------------------|
| 茨城県2012 | 準絶滅危惧 |
| 茨城県1997 | |
| 環境省2012 | |
| 分 布 | 北海道・本州・四国・九州／中国（本土・台湾） |
| 生 育 地 | 山地樹林下に生える。県内各地に点々と生育するが、個体数は少ない。 |
| 選 定 理 由 | 森林の伐採 |
| そ の 他 | |



潮来市（内山）

ムヨウラン

Lecanorchis japonica Blume

ラン科

| | |
|---------|--------------------------|
| 茨城県2012 | 準絶滅危惧 |
| 茨城県1997 | 危急種 |
| 環境省2012 | |
| 分 布 | 本州（東北地方南部以南）・四国・九州 |
| 生 育 地 | 山地林下に生える。県内の山地部にまれに生育する。 |
| 選 定 理 由 | 森林の伐採 |
| そ の 他 | |



常陸太田市（内山）

ジガバチソウ

Liparis krameri Franch. et Sav.

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 山地樹林下に生える。県内の山地部にややまれに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

アオフタバラン

Listera makinoana Ohwi

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地樹林下に生える。県内の山地部にややまれに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

ヨウラクラン

Oberonia japonica (Maxim.) Makino

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（宮城県以南）・四国・九州・琉球

生 育 地 樹幹または岩上に生える。県内各地に点在する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



筑波山（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ジンバイソウ

Platanthera florentii Franch. et Sav.

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 ブナ帯の樹林下に生える。県内の山地部にまれに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市 (内山)

ミズチドリ

Platanthera hologlottis Maxim.

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 南千島・北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国(東北)・シベリア

生 育 地 山間の湿地に生える。県内各地の湿地に生育するが、まれである。

選 定 理 由 湿地の開発, 遷移の進行

そ の 他



北茨城市 (内山)

オオヤマサギソウ

Platanthera sachalinensis F.Schmidt

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 南千島・北海道・本州・四国・九州／樺太

生 育 地 山地樹林下に生える。県内の山地部にややまれに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市 (内山)

カヤラン

Thrixspermum japonicum (Miq.) Rchb.f.

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（岩手県以南）・四国・九州

生 育 地 樹幹に着生し，県内各地に点々と生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

ヒトツボクロ

Tipularia japonica Matsum.

ラン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮南部

生 育 地 アカマツ林のような明るい林下に生える。県内各地に点々と生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）

絶
滅

絶
滅
危
惧
Ⅰ
A
類

絶
滅
危
惧
Ⅰ
B
類

絶
滅
危
惧
Ⅱ
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①
注
目
種

情
報
不
足
②
現
状
不
明
種